

VIII.2007

Genus *Locusta*

21. Species *Locusta migratoria* L.

Subspecies *Locusta migratoria rossica* L. (ph. solitaria)

1 ♂ Полтавська область, Кобеляцький район, РЛП «Нижньоворсклянський», заплавні луки р. Ворскла, VII.2007

2 ♀ Полтавська область, Пирятинський район, X.2008

Genus *Psophus*

22. Species *Psophus stridulus* L.

1 ♀, м. Полтава, урочище Триби, галявина, VII.2007

Genus *Oedipoda*

23. Species *Oedipoda caerulescens* L.

2 ♂, 8 ♀, м. Полтава, урочище Триби, галявина, VII.2006

1 ♂, 3 ♀ Полтавська область, Кобеляцький район, РЛП «Нижньоворсклянський», степові ділянки, VIII.2007

Genus *Sphingonotus*

24. Species *Sphingonotus caerulans* L.

2 ♂, 3 ♀, м. Полтава, урочище Триби, галявина, VII.2007

Infraorder Tridactilidea

Familia Tridactilidea

Genus *Tridactylus*

25. Species *Tridactylus variegates* Latr.

4 ♀, Полтавська область, Шишацький район, піщаний берег річки Псел, VI.2008

Отже, з 25 виявлених видів 3 види (12%) належить до родини Tetrigidae, 21 вид (84%) — до родини Acrididae, 1 вид (4%) до родини Tridactilidae.

Всі три види з родини Tetrigidae належать до одного роду Tetrix.

З 21 виду родини Acrididae до підродини Catantopinae належить 1 вид (4,8% від кількості видів по родині), до підродини Acridinae — 20 видів (95,2%).

ОХОРОНА ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛЕЛЕКИ ЧОРНОГО (*SICONIA NIGRA*) В ФАУНІ УКРАЇНИ

Козубенко Ю.

*ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди”*

Серед численних видів птахів, занесених до Червоної книги України, особливу увагу варто звернути на лелеку чорного. Адаже на території нашої країни залишилося не так уже й багато цих птахів. А проблемами, що виникають із відтворення та охороною цього виду нині в Україні мало хто займається.

У Червоній книзі написано: “Дані про чисельність чорних лелек фрагментарні, в Україні вона не перевищує 300 - 500 особин. На всій території СНД 3-5 тисяч гніздових пар. Спостерігається тенденція до зменшення їх кількості. Занесені вони також до II додатку Бернської конвенції.

На відміну від білого лелеки, який гніздиться поблизу осель, чорні лелеки вкрай обережні: гніздяться у важкодоступних, добре замаскованих місцях (здебільшого в глухих лісах), тримаються подалі від людей, і навіть від своїх “родичів”.

В одному з видань можна прочитати таке: "Ніхто не бачив гнізда, кладки яєць та лелеченят цього птаха, будь-які відомості про нього викликають зацікавленість".

В Україні існує дві популяції чорних лелек: карпатська (у цих місцях зафіксували 150 гніздових пар) та польська (від Волинської до Сумської області, де гніздиться близько 400-500 пар). В останні десятиліття птахи почали ставитися до нас більш приязно, а їх чисельність почала потроху збільшуватися. Однак минулого року науковці Західноукраїнського орнітологічного товариства дослідили, що у Рівненській, Житомирській, Волинській областях багато покинутих гнізд чорних лелек, знайдено також мертвих пташенят. У Карпатах навіть існує така легенда: подібно до білого лелеки, хотів гніздитися у селах на дахах будівель і чорний лелека. Але чорний птах сприймався жителями як недобрый знак. Зважаючи на це, жителі намагалися всіма можливими засобами вигнати небажаного гостя зі своїх дахів. Тому цей птах і до сьогодні уникає людей. Також це є однією з можливих причин зменшення кількості цього виду на території України.

Пояснюється зменшення чисельності лелеки чорного в нашій країні і скороченням площ кормових угідь. А харчуються ці птахи рибою, земноводними, молюсками, комахами та іншою тваринною їжею. У невеликій кількості поїдають болотні і річкові рослини. Впливають на скорочення чисельності різні чинники. Зокрема птахи стають здобиччю браконьєрів, а це фактично бездумне варварське винищування, бо користі від убитого птаха немає. М'ясо грубе, несмачне, а про перо і розмову вести не варто. Практично тіло убитого лелеки викидають. Він був лише мішенню, що випадково потрапила у поле зору стрільця. Також безглуздо руйнують гнізда лелек, знищують дерева, на яких лелеки «мешкали» роками [3, 210].

Чорні лелеки утримуються у ряді зоопарків світу, в деяких (наприклад, у Віденському, Будапештському, Нюрнберзькому) вони розмножуються. У одній кладці буває 3-5 яєць, їх насиджують обидва батьки протягом 35-40 днів. [3, 211]. У зоопарках України чорний лелека утримується загальною кількістю до 20 особин.

Тож потрібно вжити всіх необхідних засобів, щоб зберегти цього рідкісного і красивого птаха. Адже лелеки споконвіку були гордістю і символом нашого народу.

Література

1. Куйбіда В.В., Гаврись Г.Г., Лопатинська В.В. Зоологія хребетних. Практикум: посібник з навчально-польової практики. – К.: Міленіум, 2007. – 212с: іл.
2. Сосновский И.П. Редкие и исчезающие животные: По страницам Красной книги СССР. – М.: Лесн. пром-сть, 1987. – 367с: ил.
3. Фесенко, Г. В., Бокотей А.А. Птахи фауни України: польовий визначник. - Київ, 2002. - 416 с.

ВЛИЯНИЕ ОТБОРА ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ НА ПЛОДОВИТОСТЬ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ *DROSOPHILA MELANOGASTER*

*Колесник О.А., Красносельская А.А.
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова*

Введение
Изучение влияния антропогенных факторов на биологические системы